KNE CERTIS
ALLIANCE FOR GROWTH

НАТЮР БРЕЙКЪР
NATUR BREAKER

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:
Пиретрини 40 г/л

И Н С Е К Т И Ц И Д

ОПАСНО!
ПРЕПАРАТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
ПРЕДИ УПОТРЕБАТА НА ПРЕПАРАТА ВНИМАТЕЛНО ДА СЕ ПРОЧЕТАТ УКАЗАНИЯТА НАПИСАНИ В ЕТИКЕТА!
ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНАТ РИСКОВЕТЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ И ОКОЛНАТА СРЕДА, СПАЗВАЙТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА УПОТРЕБА !

ВНИМАНИЕ

GHS09

ФУНКЦИЯ НА ПРЗ:
Биологичен инсектицид от ново поколение с широк спектър на действие за борба срещу голям брой неприятели по овощни култури, зеленчукови култури на открито и в оранжерии, лозя, дини, пъпеши, тикви и др

ХИМИЧЕСКО НАИМЕНОВАНИЕ НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО:
Пиретрини
ISO наименование: Пиретрин екстракт
CAS № 8003-34-7
ВИД НА ФОРМУЛАЦИЯТА: ЕК– Емулсионен концентрат
РАЗРЕШЕН ЗА УПОТРЕБА в Република България с: .
Удостоверение за разрешаване предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита на Министерството на земеделието и храните Удостоверение 01505/30.10.2017 г.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА: **1 лт**

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО:
CERTIS EUROPE B.V. sucursal en España
Parque empresarial Elche, C/ Juan de Herrera 5 PB, 03203 ELCHE (Alicante), Spain
Tel: +34-966651077 Fax: +34-966651076

ВНОСИТЕЛ:
КНЕ СЕРТИС ЕООД
Бул. "Евлоги Георгиев" №102, 1505 София, България
Тел: 02/819 49 77Факс: 02/819 49 70

РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА / ПРИЛОЖЕНИЕ:
НАТЮР БРЕЙКЪР е разрешен за употреба в Република България при:

Домат, патладжан, пипер (на открито и в оранжерии):
Срещу белокрилки *(Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum)*
- Доза на приложение: 75 мл/дка
- Количество на работния разтвор 80-100 л/дка
- Третирането се извършва при поява на неприятеля
- Максимален брой приложения: 2
- Интервал между приложенията: 7 дни

Тиквови с ядлива кора – краставица, тиквичка (на открито и в оранжерии):
Срещу белокрилки *(Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum)*
- Доза на приложение: 75 мл/дка
- Количество на работния разтвор 80-100 л/дка
- Третирането се извършва при поява на неприятеля
- Максимален брой приложения: 2
- Интервал между приложенията: 7 дни

Тиквови с неядлива кора – пъпеш, диня, тиква (на открито и в оранжерии):
Срещу белокрилки *(Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum)*
- Доза на приложение: 75 мл/дка
- Количество на работния разтвор 80-100 л/дка
- Третирането се извършва при поява на неприятеля
- Максимален брой приложения: 2
- Интервал между приложенията: 7 дни

Марули, полска салата/кълнове салата, бейби култури вкл. от род Brassica, рукола, кресон, земен кресон, червен синап, къдраво листна/широколистна ендивия (включително бейби култури), спанак, тученица, листно и салатно цвекло (на открито и в оранжерии):
Срещу листни въшки *(Nasonovia ribisnigri Aphis gossipii, Aphis fabae)*
- Доза на приложение: 60 мл/дка
- Количество на работния разтвор 66-80 л/дка
- Третирането се извършва при поява на неприятеля
- Максимален брой приложения: 2
- Интервал между приложенията: 7 дни

Костилкови (праскова, нектарина, кайсия, слива, череша):
Срещу Прасковена листна въшка *(Myzus persicae)*
- Доза на приложение: 75 мл/дка
- Количество на работния разтвор 80-100 л/дка
- Третирането се извършва при поява на неприятеля
- Максимален брой приложения: 2
- Интервал между приложенията: 7 дни

Лозя:
Срещу Цикада *(Scaphoideus titanus)*
- Доза на приложение: 75 мл/дка
- Количество на работния разтвор 80-100 л/дка
- Третирането се извършва при поява на неприятеля
- Максимален брой приложения: 2
- Интервал между приложенията: 7 дни

СМЕСИМОСТ:
НАТЮР БРЕЙКЪР може да се смесва с други Биологични продукти за растителна защита. Не се смесва с продукти притежаваща алкална реакция като вар, бордолезов разтвор, калциеви полисулфиди и др. Задължително трябва да се направи тест за съвместимостта между двата препарата предварително.

ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР:
Необходимото количество препарат да се излее в наполовината пълен с вода резервоар на пръскачката. След това резервоара да се долее до горе при непрекъснато разбъркване, така че да се получи хомогенна смес. Проверете дали pH на водата не е алкално (>7), и ако се наложи стабилизирайте pH на водата с разрешен за целта продукт. Използвайте полученото разтвор в деня на приготвянето му.

ДЕЙСТВИЕ НА ПРОДУКТА ВЪРХУ СЛЕДВАЩИ СЕИТБООБОРОТА КУЛТУРИ / РОТАЦИЯ НА КУЛТУРИТЕ:
НАТЮР БРЕЙКЪР не оказва въздействие върху следващите култури в сеитбооборота.

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ПРИ КОИТО ПРОДУКТА МОЖЕ, ИЛИ НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ УПОТРЕБЯВАН:
- **НАТЮР БРЕЙКЪР** се препоръчва за включване в програмите за интегрирана и биологична борба.
- **НАТЮР БРЕЙКЪР** се препоръчва и при управлението на проявата на устойчивост у неприятелите.
- Продуктът се разгражда бързо, което го прави изключително подходящ за употреба в близост до полезни насекоми.
- Третиранията трябва да се извършват при хубаво време, по възможност вечер или в по-хладните часове.
- Използвайте подходящо количество вода и налягане, за да гарантирате доброто покритие на културите, наблягайки особено на долната част на листата.
- Когато се използва дозата на 100 л вода и се прилага различно количество работен разтвор на декар, трябва да се преизчисли така, че да се спази разрешената доза продукт на декар.
- Категория на употреба: **втора професионална**.
- Период от последното третиране до прибирането на реколтата **(карантинен срок)**:
- Домат, патладжан, пипер, тиквови с ядлива кора (краставица, тиквичка), тиквови с неядлива кора (пъпеш, диня, тиква) – **1 ден**
- Марули, полска салата/кълнове салата, бейби култури вкл. от род Brassica, рукола, кресон, земен кресон, червен синап, къдраво листна/широколистна ендивия (включително бейби култури), спанак, тученица, листно и салатно цвекло – **2 дни**
- Праскова, нектарина, лозя – **3дни**
- Кайсия, слива, череша – **не се налага**

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:
НАТЮР БРЕЙКЪР е биологичен инсектицид съдържащ екстракт от естествен пиретрум със силно изразено контактно и известно репелентно действие срещу всички стадии от развитието на неприятелите: яйца, ларви, нимфи и възрастни. При контакт с насекомите той предизвиква много бърз шоков ефект паразявайки нервната им система, което води до парализа в следствие на което те загиват напълно.

ПЪРВА ПОМОЩ И МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ:
- ПРИ ПОПАДАНЕ ВЪРХУ КОЖАТА - Да се изплакне обилно с вода. Да се потърси лекарска помощ при наличие на трайни симптоми.
- ПРИ ПОПАДАНЕ В ОЧИТЕ - Да се изплакне обилно с питейна вода или стерилен разтвор за промиване на очи. Да се потърси лекарска помощ ако се появят симптоми.
- ПРИ ВДИШВАНЕ - Да се изнесе пострадалият на чист въздух.
- ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ - Незабавно да се потърси лекарска помощ.
- СЪВЕТИ ЗА ЛЕКАРЯ - Лечението е симптоматично. При нужда да се консултира с Центъра по остри отравяния – София при УМБАЛСМ Пирогов, на следния телефон: 02/915 42 33, Европейски номер за спешни повиквания – 112.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ:
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
EUH208 Съдържа екстракт от пиретрини. Може да предизвика алергична реакция.
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда спазвайте инструкциите за употреба.

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:
P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
P391 Съберете разлятото.
P401 Да се съхранява далече от храни, напитки и храна за животни.
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с националната уредба за третиране на опасни отпадъци.

ДОПЪЛНИТЕЛНО ЕТИКЕТИРАНЕ:
Sp1 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства използваната техника в близост до повърхностни води/Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища.).
SPe3 Да се осигури нетретирана буферна зона до повърхностни води, с цел опазване на водните организми при
- зеленчуци: 10 метра в комбинация с дюзи намаляващи отвяването на струята с 50%;
- лози: 10 метра в комбинация с дюзи намаляващи отвяването на струята с 90%;
- праскови и нектарини: 20 метра в комбинация с дюзи намаляващи отвяването на струята с 90%;
- кайсии, сливи и череши: 20 метра в комбинация с дюзи намаляващи отвяването на струята с 90%

SPe3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра до неземеделски земи при костилкови овощни видове, с цел опазване на членестоногите, които не са обект на третиране.
SPe8 Опасен за пчелите. Да не се прилага при култури в период на цъфтеж с цел опазване на пчелите и други насекоми опрашители. Да не се използва, където има активна паша на пчели. Да не се прилага при наличие на цъфтяща плевелна растителност.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ РАБОТА С ПРЕПАРАТА:
- Да не се яде, пие или пуши по време на работа с препарата.
- Да не се вдишва мъглата от разпръсквания разтвор.
- Да се носи защитно облекло, ботуши, ръкавици, защитна маска и очила.
- Да не се допуска контакт с кожата и очите.
- Работници без защитно облекло и оборудване и особено деца, да не се допускат до местата на приготвяне на работния разтвор и пръскане.
- Да не се влиза в третираните зони преди работният разтвор да е изсъхнал напълно.

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ:
- Препаратът да се съхранява само в оригиналната опаковка, като след всяка употреба плътно да се затваря опаковката.
- Да се пази извън обсега на деца, далеч от хранителни продукти, напитки и фуражи.
- Да се съхранява на сухо и проветриво място.

ТРАНСПОРТИРАНЕ:
Да се извършва съгласно изискванията за превоз на опасни химични вещества съгласно Европейското споразумение за транспортиране на опасни товари с шосеен и железопътен транспорт /ADR/RID 2015/.

ЕКОТОКСИЧНОСТ:
НАТЮР БРЕЙКЪР е токсичен за водните организми.

МЕРКИ ПРИ ИНЦИДЕНТНО РАЗЛИВАНЕ/РАЗСИПВАНЕ:
Ограничете разлива, абсорбирайте с подходящ материал, съберете в отделен затварящ се контейнер. Отпадъците да се унищожат в съответствие със Закона за управление на отпадъците.

МЕРКИ В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР:
Няма конкретен риск от пожар или експлозия. Избягвайте вдишването на дим или пари, защото те могат да включват токсични въглеродни окиси.
Подходящи средства за гасене на пожар: пулверизирана вода, стандартна пяна, въглероден диоксид, сух химикал.

УНИЩОЖАВАНЕ НА ПРАЗНИТЕ ОПАКОВКИ:
Измиване на опаковката трикратно след изпразването й, а съдържанието да се изсипе в резервоара на пръскачката. Опаковката да не се използва повторно. Празните опаковки и замърсените контейнери да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (ДВ бр.53/13.07.2012 г).

ПАРТИДЕН № .....

СРОК НА ГОДНОСТ: 2 години.

ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО:.....

SCPP 1217
System for Collection of Pesticide Packaging

305x130