



ЕРАДИКОТ МАКС

ERADICOAT MAX

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
ПРЕДИ УПОТРЕБАТА НА ПРОДУКТА ВНИМАТЕЛНО ДА СЕ ПРОЧЕТАТ
УКАЗАНИЯТА НАПИСАНИ В ЕТИКЕТА!
ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНАТ РИСКОВЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ И ОКОЛНАТА СРЕДА,
СПАЗВАЙТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ!

Инсектицид

ФУНКЦИЯ НА ПРЗ:

Контактен инсектицид с бързо действие във формулация разтворим концентрат (СЛ), съдържащ 476 г/л (40% w/w) малтодекстрин за контрол на обикновен паяжинообразуващ акар и белокрылки по всички ядливи и неядливи култури в оранжерии.

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

Малтодекстрин 476 г/л

ХИМИЧЕСКО НАИМЕНОВАНИЕ НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО:

Малтодекстрин

ISO наименование: Малтодекстрин

EC № 232-940-4

CAS № 9050-36-6

ВИД НА ФОРМУЛАЦИЯТА: СЛ – разтворим концентрат

РАЗРЕШЕН в Република България с:

Разрешение № 01740-ПРЗ/2-29.06.2020г. за пускане на пазара и употреба на продукт за растителна защита на изпълнителния директор на БАБХ.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА: 5л

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ:

CERTIS EUROPE B.V.

Stadsplateau 16, 3521 AZ Utrecht, The Netherlands, Tel: +31 (0) 30 200 1200

ДИСТРИБУТОР ЗА БЪЛГАРИЯ:

KNE CERTIS EOOD

Бул. "Евлоги Георгиев" №102Р 1505 София, България Тел: 02/819 49 77 Факс: 02/819 49 70



GHS05



145x140

ЕРАДИКОТ МАКС

ERADICOAT MAX

РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА / ПРИЛОЖЕНИЕ:

ЕРАДИКОТ МАКС е разрешен за употреба в Република България при всички ядливи и неядливи култури в оранжерии за контрол на:

ВРЕДИТЕЛ	ФАЗА НА РАЗВИТИЕ	МЕТОД НА ПРИЛОЖЕНИЕ	ДОЗА	ПОСЛЕДВАЩИ ПРИЛОЖЕНИЯ
Обикновен паяжино-образуващ акар (<i>Tetranychus urticae</i>)	Всички фази на развитие	Времето и интервалът между приложенията зависи от степента на нападение и условията на околната среда. Минималният интервал между приложенията е 3 дни. Последващите третирания ще оказват контрол върху новопоявилите се нимфи.	0.4-6.0 л продукт/да приложен с 20-300 л/да количество вода.	Повтарянето на приложението на ЕРАДИКОТ МАКС или въвеждането на биологични средства, могат да бъдат необходими за поддържане на контрола
Белокрылки (<i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Bemisia tabaci</i>)	Всички фази на развитие			

Максимален брой третирания на култура: 20.

Техника на приложение: конвенционална наземна техника.

Интервал между приложенията: 3 дни

Карантинен срок (минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата) - не се налага

Други специфични ограничения: препоръчва се 20 мл продукт на 1 л вода.

СМЕСИМОСТ:

Не са дадени общи инструкции за смесимост на ЕРАДИКОТ МАКС от производителя.

Задължително предварително трябва да се направи тест за съвместимост!

ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР:

Необходимо количество продукт да се излее в наполовина пълен с вода резервоар на пръскачката (за предпочитане водата да е с неутрално pH). След това резервоара да се долее до горе при непрекъснато разбъркване, така че да се получи хомогенна смес. Да се подсигури цялостно разбъркване преди употреба.

ДЕЙСТВИЕ НА ПРОДУКТА ВЪРХУ СЛЕДВАЩИ В СЕИТБООБОРОТА КУЛТУРИ / РОТАЦИЯ НА КУЛТУРИТЕ:

При спазване на препоръките за употреба, продуктът не оказва въздействие върху следващите култури в сеитбооборъчването.

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ПРИ КОИТО ПРОДУКТА МОЖЕ ИЛИ НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ УПОТРЕБЯВАН:

- Да се използва техника, намаляваща отсянето на разтвора.
- Да се подсигури добро покритие и контакт с вредителя.
- Да се пръска до потичане и пълно покритие на растението, да се отдели специално внимание върху долната страна на листата и точките на растеж
- ЕРАДИКОТ МАКС е най-ефективен в условия за бързо изсушаване.
- При използване на ръчна пръскачка, за най-добри резултати, да се използва дюзи тип плоско ветрило или кук конус, осигуряващи фино до средно пръскане.
- Поради голямото разнообразие на култури, които могат да се третират, е важно няколко растения да се тестват преди третирането на по-големи площи.
- Да се избягва третирането на цветовете на украсителните/декоративните видове.
- Може да има лепкави остатъци върху плодoвете, например домати, а също и върху листата, например при листните зеленчуци.
- Категория на употреба: Втора професионална.
- Не се налага период на изчакване преди повторно въвеждане.

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

ЕРАДИКОТ МАКС има физически механизъм на действие, като блокира дихателните отвори на вредителя, което води до задъшаване и предоставя високо ниво на контрол при многократно приложение. Ефектите от приложението му, обикновено се виждат скоро след третирането, в зависимост от условията на средата. Заради контактноя механизъм на действие, са необходими повторни приложения, за да се осигури продължителен контрол.

ПЪРВА ПОМОЩ И МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ:

- ПРИ ПОПАДАНЕ ВЪРХУ КОЖАТА - Да се изплакне обилно с вода. Да се потърси лекарска помощ при наличие на трайни симптоми.
- ПРИ ПОПАДАНЕ В ОЧИТЕ - Да се изплакне обилно с питейна вода или стерилен разтвор за промиване на очи. Да се потърси лекарска помощ ако се появят симптоми.
- ПРИ ВЪДЪШАНЕ - Да се изнесе пострадалият на чист въздух.
- ПРИ ПОГЪЛВАНЕ - Незабавно да се потърси лекарска помощ.
- СЪВЕТИ ЗА ЛЕКАРЯ - Лечение е симптоматично. При нужда да се консултира с Центъра по остри отравяния - София при УМБАЛСМ Пирогов, на следния телефон: 02/815 42 33, Европейски номер за спешни повиквания - 112.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ:

H318 Предиизвиква сериозно увреждане на очите.

EUN401 За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда спазвайте инструкциите за употреба.

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промийте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно.

Продължавайте да промивате.

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие със Закона за управление на отпадъците.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ РАБОТА С ПРОДУКТА:

- Да не се яде, пие или пуши по време на работа с продукта.
- Да не се вдъшва мъглата от разпръсквания разтвор.
- Да не се носят лични предпазни средства – защитни ръкавици и защитни очила/защитна маска за лице по време на работа с концентрата.
- Да не се допускат контакт с кожата и очите.
- Работници без защитно облекло и оборудване и особено деца, да не се допускат до местата на приготвяне на работния разтвор и пръскане.

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ:

- Продуктът да се съхранява само в оригиналната опаковка, като след всяка употреба пълно да се затваря опаковката.
- Да се пази извън обсега на деца, далеч от хранителни продукти, напитки и фуражи.
- Да се съхранява на сухо и вентилаторно място при стайна температура.

ТРАНСПОРТИРАНЕ:

Да се извършва съгласно изискванията за превоз на опасни химични вещества съгласно Европейското споразумение за транспортиране на опасни товари с шосеен и железопътен транспорт /ADR/RID 2015/.

ЕКОТОКСИЧНОСТ:

ЕРАДИКОТ МАКС може да има неблагоприятен ефект върху не-целови насекоми и други членестоноги, които са в контакт с работния разтвор, но няма остатъчно действие. Полезните насекоми, могат да бъдат внесени повторно в културата след като растенията се изсушат.

МЕРКИ ПРИ ИНЦИДЕНТНО РАЗЛИВАНЕ/РАЗСИПВАНЕ:

Ограничете разлива, абсорбирайте с подходящ материал, съберете в отделен затварящ се контейнер. Отпадъците да се унищожат в съответствие със Закона за управление на отпадъците.

МЕРКИ В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР:

При възникване на пожар да се гаси с водна струя, сух химически прах, алкохол-резистентна пена, въглероден диоксид.

УНИЩОЖАВАНЕ НА ПРАЗНИТЕ ОПАКОВКИ:

Измиване на опаковката трикратно след изпразването ѝ, а съдържанието да се изсипе в резервоара на пръскачката. Опаковката да не се използва повторно. Празните опаковки и замърсените контейнери да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (ДВ бр.53/13.07.2012 г.).

ПАРТИДЕН №

ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО:

СРОК НА ГОДНОСТ: 2 години.



System for Collection of
Pesticide Packaging



0421